



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ



VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

ATENȚIE!

VARIOLA OVINĂ ȘI CAPRINĂ

Boală virală gravă foarte contagioasă care afectează
ovinele și caprinele.

Se manifestă prin leziuni cutanate (pete roșii, papule, vezicule
și cruste) apatie, febră, lacrimație excesivă, secreții nazale,
noduli și mortalitate ridicată.

Principala cale de transmitere este prin contact direct cu animalele
și indirect prin furaje, echipamente, utilaje și vehicule.

Nu prezintă risc pentru om !

ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ TREBUIE ANUNȚATĂ
IMEDIAT MEDICULUI VETERINAR DIN LOCALITATE
SAU D.S.V.S.A. JUDEȚEANĂ

Instruire privind variola ovina și caprina

Simptomele variolei ovine și caprine includ:

1. Leziuni cutanate:

Acesta este semnul distinctiv al bolii. La ovinele/caprinele infectate apar inițial mici pete roșii pe piele, care evoluează în papule (bășici solide) și apoi în vezicule (bășici cu lichid). Aceste leziuni se pot dezvolta ulterior în pustule și cruste. Leziunile cutanate apar de obicei pe:

- o Cap (în special în jurul botului, nasului și urechilor, pleoapelor)
- o Abdomen
- o Picioare
- o Organele genitale
- o Axile

2. Febră:

Animalele infectate dezvoltă de obicei febră ridicată (40-42 °C) în primele 1-3 zile de la infectare.

3. Scăderea apetitului:

Ovinele/caprinele bolnave pot prezenta o lipsă de interes pentru hrană, ceea ce duce la scăderea în greutate.

4. Depresie și letargie:

Ovinele/caprinele afectate devin letargice, cu o stare generală proastă, manifestând apatie și lipsă de energie.

5. Lacrimație excesivă și secreții nazale:

La multe animale infectate se observă secreții oculare și nazale. În cazuri severe, aceste secreții pot deveni purulente.

6. Inflamația ganglionilor limfatici:

Ganglionii limfatici submandibulari și cei din regiunea subcutanată a corpului pot fi inflamați și măriți.

7. Leziuni la nivelul mucoaselor:

În cazurile grave, pot apărea leziuni și pe mucoasele bucale, nazale și oculare, care pot cauza dificultăți de respirație sau probleme de alimentație.

8. Durata bolii:

În majoritatea cazurilor, boala durează 3-4 săptămâni, dar animalele pot rămâne slăbite și eliminatoare de virus pentru o perioadă mai lungă de timp.





Mortalitatea poate varia în funcție de gravitatea focarului și de starea generală de sănătate a efectivului de ovine.

9. **Perioada de incubație:** perioada de incubație este de obicei de 1-2 săptămâni, dar poate fi și mai scurtă, de 2-4 zile.

Transmiterea bolii:

Variola ovină și caprină se transmite prin contact direct între animale infectate și cele sănătoase (în țarc, pășune, piețe etc) și prin contact indirect cu lichidul din conținutul veziculelor, pustulelor și prin inhalarea prafului din crustele descumate.

Virusul poate fi răspândit și prin:

- Secrețiile nazale, oculare și orale
- Leziuni cutanate rupte
- Păr, lână
- Obiecte contaminate, apă (furaje, echipamente)
- Transmiterea mecanică (insecte care mușcă)

Este important de menționat că mediul poate rămâne contaminat pentru o perioadă lungă de timp, astfel încât măsurile de igienă și biosecuritate sunt esențiale pentru prevenirea răspândirii bolii, virusul fiind foarte rezistent la uscăciune.

RECOMANDARI PENTRU CRESCATORII DE OVINE SI CAPRINE DIN ROMANIA:

- a) Operatorii economici care achiziționează ovine și caprine din Bulgaria au obligația de a prenotifica DSVSA județeană privind orice achiziție din Bulgaria. La fiecare transport de ovine și caprine, medicul veterinar va asista la debarcarea animalelor din mijlocul de transport și va efectua un examen clinic riguros al tuturor animalelor. Animalele nou introduse vor fi ținute izolate pentru o perioadă de 21 de zile până la introducerea în efectivul indigen.
- b) Operatorii economici din România trebuie să evite tranzitarea zonelor de restricție care vor fi stabilite prin Decizie a CE, indiferent de scop, pentru a se evita orice risc de introducere a bolii pe teritoriul României;
- c) Aplicarea de măsuri stricte de biosecuritate în exploatarea cu ovine și caprine, inclusiv controlul accesului persoanelor și al vehiculelor;
- d) Notificarea imediată a medicului veterinar în cazul observării semnelor clinice suspecte (erupții cutanate, febră, stare generală proastă);





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BRĂILA

- e) Respectarea cu strictete a legislației în vigoare, a recomandărilor și măsurilor dispuse de autoritățile veterinare.

Cu stima,

Director Executiv,

Dr. Peltea Costica



	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătură
Avizat	Dr. Arsene Marian	Director Executiv adjunct	10.09.2024	
Avizat	Dr. Radu Lucica	Sef Serviciu COSBA	10.09.2024	
Elaborat	Dr. Nastase Silviu	Consilier superior SCOSBA	10.09.2024	

